

Environnement urbain et Leishmaniose cutanée: Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La leishmaniose cutanée est une maladie parasitaire se manifestant par l'apparition de plaies sur les parties exposées du corps du à la piqûre d'un insecte appelé phlébotome. L'étude a permis de rechercher les liens pouvant exister entre le cadre de vie des ménages et la recrudescence de la leishmaniose. En effet, à partir de 1996, les statistiques montrent une augmentation du nombre de cas à Ouagadougou. Nous sommes partis sur les postulats que les facteurs du cadre de vie individuel des ménages tels que le type de matériaux de l'habitat, le mode d'éclairage, les modes d'alimentation en eau potable, d'évacuation des eaux usées et des ordures ménages pouvaient influencer significativement la recrudescence de cette maladie. La conception et la réalisation de cette étude s'est réalisé dans le cadre d'une équipe transdisciplinaire en collaboration avec les populations. Les outils utilisés sont : ateliers, enquêtes, analyses de laboratoire et visites d'observation sur le terrain. Les résultats obtenus montrent que la survenue de la leishmaniose n'est pas liée à un cadre de vie individuel mais à un environnement collectif.

22 juil. 2016 . Constatant la violence de l'offensive et ses conséquences sur la population .. MSF présents : Aucun BURKINA FASO; Médecins Sans Frontières • Rapport .. de santé de la ville, mais aussi de créer un environnement de soins ... et 182 patients souffrant de leishmaniose cutanée ont été pris en charge.

La méthode avait l'avantage de contourner les complications du « facteur . des conséquences possibles des modifications de l'environnement sur la santé des .. les berbères atteints de leishmaniose et traités avec du tartrate de potassium et .. le Burkina Faso (1). sciences.1 48 V

La lutte contre les schistosomoses en.

Lutte contre la tsé-tsé (y compris effets secondaires sur l'environnement). 38. 4. ... l'École de Lutte Anti Tsé-tsé (ELAT) à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Vingt-trois . Ces deux facteurs jouent un rôle important dans la transformation en ... leishmaniose, de la maladie du sommeil africaine et de la maladie de Chagas.

30, Mathieu Ouédraogo, BUSINESS & ECONOMICS / General, Economics . et industrielles de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso, 9783841670571, 116 ... Environnement urbain et Leishmaniose cutanée, Facteurs à l'origine de la . de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de.

Veillez adresser vos demandes d'information au sujet du CRDI et de ses . l'environnement; les maladies tropicales; l'approvisionnement en eau; les services . communications; les politiques urbaines; les questions liées aux femmes et le .. au Burkina Faso, vise à remplacer les huiles .. leishmaniose cutanée afm de.

La recrudescence du nombre de cas et l'extension de la maladie à plusieurs zones . La Leishmaniose cutanée est connue dans le bassin du Hodna sous forme de cas .. Ces variations morphologiques sont à l'origine de la description de .. Clastrier en 1956 capture *P.longicuspis* dans la ville de Biskra et dans la.

Au Burkina Faso, une étude menée entre 1996 et 1998 a recensé 1.847 cas et a . leishmaniose tégumentaire dans la ville de Ouagadougou [47]. ... La co-infection VIH - Leishmaniose est à l'origine de leishmaniose cutanée .. leishmaniose cutanée et ses conséquences socioéconomiques et sanitaires dans le secteur.

The mission of the PAMJ is to create, stimulate and perpetuate a culture of information sharing and publishing amongst researchers and other health actors of.

7 mai 2014 . 07h30-15h00 . dengue en milieu semi urbain de deux districts sanitaires ..

Ouédraogo au Burkina Faso : à propos de 50 cas. .. crues dans la ville de Ouagadougou : .. croissance intra uterin d'origine vasculaire ... pour but d'étudier l'impact de ces facteurs .. la prévalence de la leishmaniose cutanée.

Les facteurs prédictifs de malignité dans la prise en charge des tumeurs .. Les leishmanioses cutanées à *Leishmania major* et à *Leishmania tropica* au . l'enfant malnutri dans un milieu minier: cas de la ville de Lubumbashi et ses environs ... cardiologie du CHU Yalgado

Ouedraogo de Ouagadougou, Burkina Faso.

. Burkina Faso: Les magistrats apprécient leur code de déontologie(Sidwaya) · Burkina .

Algérie: Boumerdès couvre largement ses besoins en eau potable(Algerie .. Sénégal: Le SIA 2017, une occasion de partage des difficultés du secteur .. Recrudescence des pathologies de brucellose et de leishmaniose cutanée.

2 sept. 2013 . appréhender au mieux l'environnement militaire dans lequel le .. Soudan devient la Haute-Volta (Burkina-Faso) qui sera dissoute en .. 6 Self government : Système d'administration, d'origine britannique, .. Ces forces sont armées par des modules30 projetables pour des .. Fig.2 : amibiase cutanée.

7 oct. 2016 . À ces facteurs sanitaires s'ajoutent aussi des représentations sociales qui . La précarité des services de santé des pays à ressources limités est à l'origine d'une .. l'hôpital de district du secteur 30 de Ouagadougou, au Burkina Faso dans .. Bilan sur la leishmaniose cutanée au CHU Mustapha après la.

IMPACT DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-DEMOGRAPHIQUES. DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO). Réalisée par.

82% des répondants étaient d'origine ivoirienne, ont notait 28,2% de déplacés. . DE PALUDISME DANS UN GROUPE DE TOURISTES AU BURKINA FASO . en médecine et santé tropicales, Faculté de Médecine Secteur Nord 7 - UPCET, .. CHEZ 2 PATIENTS ATTEINTS DE LEISHMANIOSE CUTANÉE LOCALISÉE DE.

8 févr. 2017 . encore consolidé ses résultats en 2016, selon son bilan d'en- . de moyens de transport urbain et suburbain seront desservies . feu vert pour l'octroi d'une assiette de 3.000 m² au centre-ville ... tion, permettant ainsi au secteur de cibler le ... BRUCELLOSE ET LEISHMANIOSE CUTANÉE EN 2016.

Environnement urbain et leishmaniose cutanée by Lydie Yiougo; Théophile Sanon; Salomon Ouedraogo and a . Environnement urbain et Leishmaniose cutanée : Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

18 mai 2013 . d'assurer la surveillance du paludisme dans ces zones. .. approche intégrée axée sur la réduction des facteurs communs de ... contamination chimique, radioactive ou maladie d'origine . Leishmanioses ... enfant qui a de la fièvre et présente une éruption cutanée sur tout le corps peut .. Ville:_____.

. 978-3-8417-3749-6. 2391.25 py641.13 \$ · Bookcover of Environnement urbain et Leishmaniose cutanée . Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

Ainsi, la recrudescence que connaît la leishmaniose viscérale chez l'adulte et son .. Les conséquences de ces brûlures, toujours profondes, sont souvent ... Les dermatites de contact sont des réactions cutanées provoquées par des .. enceintes VIH séropositives et séronégatives à Ouagadougou, Burkina Faso.

Environnement urbain et Leishmaniose cutanée: Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur . Faso . Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

Au Burkina Faso la population est difficile à maîtriser en raison de sa forte mobilité et de l'extension rapide de la ville de Ouagadougou marquée par l'émergence . Pissy et dans le secteur 30 (Milieu les plus touchées lors de la dernière .. Evaluation Environnement urbain et leishmaniose cutanée :Diagnostic du secteur.

5 juin 2009 . Les conséquences du changement climatique, la rareté croissante et la dégradation

.. au Burkina Faso la diversité alimentaire en milieu.

Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

le genre s'avèrent des questions transversales pour ces trois secteurs . Afrique centrale ; et Énergie-Environnement et Développement (ENDA) ... les populations vulnérables des conséquences du . leishmaniose, de la fièvre jaune, de la dengue et de la ... La région comprend trois pays enclavés (le Burkina Faso,.

Ouagadougou, Burkina Faso. Tél. (226) 33 40 98. . Situation des schistosomoses au Burkina Faso. 177 ... Ces réussites nous ont montré que certains facteurs sont déterminants .. en Afrique ont le plus souvent eu comme conséquence unerecru- .. de leishmaniose et traités avec du tartrate de potassium et d'antimoine.

. 154170 SA 146013 JE 143140 ON 141375 SES 132434 DEUX 131605 FAIT . DIMANCHE 19597 VILLE 19573 GÉNÉRAL 19419 PUIS 19415 ETATSUNIS . DÉVELOPPEMENT 15027 SECTEUR 14950 DERNIERS 14919 SARKOZY .. 30 DADDIS 30 DACOURT 30 DABIDAL 30 DABDULLAH 30 CUTANÉES 30.

Couverture de Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Omni badge Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. sanitaire des aliments, zoonoses et maladies d'origine alimentaire (FOS), Santé .. les maladies transmissibles entre toutes les institutions travaillant dans ces pays. .. Ils constituent tous des facteurs de risque de diphtérie cutanée toxigène. .. en Côte d'Ivoire en avril 2006, au Bénin en 2007 et 2008, au Burkina Faso en.

8 sept. 2012 . 1981, est à l'origine du renouveau de la climatologie française à cette .. (8) CNRS, Environnement Climatique (ex ER30), 1989 : Evaluation des . la dynamique de ce système de mousson et de ses interactions .. Figure 1 : Localisation du secteur d'étude. .. la leishmaniose cutanée zoonotique (LCZ).

Céline Rivière, pour ces moments passés ensemble à Madagascar, et la .. Plantes valorisables d'emblée pour les pathologies cutanées (parasitoses ... La ville d'Antsiranana (ou en français Diego Suarez) se trouve au Centre .. certainement à l'origine de la recrudescence des vols de vanille dans la région SAVA.

Tunisie: "La planification urbaine a dépassé les moyens de l'Etat" (chef de .. Tunisie: Analyse de la compétitivité des secteurs et des entreprises (étude) ... Tunisie: Le nouveau ministre de l'éducation prend ses fonctions 2014-01-30 15:45:12 .. 170 cas de leishmaniose cutanée dans le gouvernorat 2013-12-26 18:22:11

Environnement urbain et Leishmaniose cutanée Facteurs a l'origine de la . et ses conséquences dans le secteur Ouagadougou au Burkina Faso French Edition . La valeur du déficit en bases artériel mesure a 30 minutes de vie French Edition ... Audit de securite des soins en medecine de ville Progres en securite des.

2.7 Les autres Secteurs intervenant dans la lutte contre les MTN... ... Endémies (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et. Togo) .. FIGURE 14 : Répartition des cas de leishmanioses au Sénégal p56 .. En effet, les évaluations épidémiologiques effectuées par la méthode de biopsie cutanée.

Traitement Des Insuffisances Osseuses Des Secteurs Postéro-Maxillaires: . La Production De La Recherche Et Ses Mécanismes De Transfert: Étude .. Patrimoine Culturel Immatériel Dans Le Développement Du Burkina Faso (french Edition) .. Environnement Urbain Et Leishmaniose Cutanée: Facteurs À L'origine De.

1 juin 2012 . secteur des médicaments en Algérie et pour lutter contre le pillage des . Bainem. Ces mesures entreront en vigueur à la mi-juin et se pour-

De nos jours, plusieurs restaurations s'accomplissent dans notre ville et le monde. ... en minimisant votre impact sur l'environnement Douze pages de conseils .. -urbain-et-leishmaniose-cutanee-facteurs-a-l-origine-de-la-recrudescence-de-la-leishmaniose-cutanee-et-ses-consequences-dans-le-secteur-ouagadougou-au-

Portada del libro de Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Omni badge Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

9 mars 2016 . 10h00-11h30 .. DE OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO .. décennies, Korhogo et Kaédi subissent les conséquences des ... Ont été retenus tous les cas de leishmaniose cutanée retrouvés dans les . Les secteurs de la périphérie sud-est de la ville sont plus touchés .. Pour le test de recrudescence.

vecteurs prouvés de la leishmaniose cutanée: Phlebotomus (Phlebotomus) ... rural déjà existants à l'intérieur de la ville, tous ces facteurs favorisent la pullulation du . milieu urbain de Marrakech avec une étude détaillée de l'effet de ... Il faut 30 secondes à 5 minutes pour que l'estomac d'un phlébotome soit rempli. Chez.

Capa do livro de Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Omni badge Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. 31 déc. 2012 . Médecins Sans Frontières a pris en charge 150.000 de ces enfants dont 30.000 . C'est bien dans le cadre de nos projets au Burkina Faso, entre 2008 et 2011, que ... La croissance du mouvement MSF, conséquence et condition de son .. des cas de leishmaniose cutanée et une unité d'hospitalisation.

S appuyant sur une approche écosystémique à la santé humaine, ses recherches . Africa (mainly Tanzania, Chad, Burkina Faso and Côte d'Ivoire), Asia (China, Thailand, .. and consequences on infectious diseases of humans and animals in Tanzania. .. (Dolly Jackson-Sillah) Leishmaniose cutanee en zone urbaine et.

1 avr. 2008 . Gilead – AmBisome® contre la leishmaniose. 63 .. l'industrie pharmaceutique de recherche et ses partenaires pour .. Au total, 30 médicaments contre le VIH/SIDA . ventions prioritaires liées au VIH/SIDA dans le secteur de la santé » ... au Burkina Faso, en Inde, au Kenya, au Malawi, en Roumanie, en.

E.K. : Je dis à mes compatriotes que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont .. que trop duré avec ses conséquences sociales, économiques, matérielles, humaines et ... parfois toucher l'homme; la leishmaniose, un parasite qui se propage par les .. Mel Eg Théodore (ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine) - La.

L'analyse des facteurs de risque a été réalisée par régression logistique uni- et ... 2015 dans deux quartiers péri-urbains de la ville de Douala, Yassa (industrialisé) et .. L'éclampsie au CHU-Yalgado de Ouagadougou (Burkina Faso) du 1er avril . Étude rétrospective de la leishmaniose cutanée à l'hôpital de district d'Am.

LOCALISATION ATYPIQUE DE LA LEISHMANIOSE CUTANEE. . PREVALENCE ET FACTEURS ASSOCIES DE LA MALNUTRITION AIGÛE . DE 6 A 24 MOIS DANS LA VILLE DE LOKOSSA, BENIN EN 2015. ... jacente, étiologie ou conséquence de .. Yalgado Ouédraogo 03 BP 7022 Ouagadougou, Burkina Faso.

Spécialiste des leishmanioses il a publié plus de 330 articles scientifiques, . l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. .. récurrente mondiale à pou et de la leishmaniose cutanée, la trypanosomose du .. La recrudescence des facteurs de risque des maladies non transmissibles,.

19 août 2011 . Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses

conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Editions universitaires européennes (19.08.2011). € 39,00.

Face à la fréquence croissante des mycoses cutanées. .. au surpoids et à l'obésité des élèves de Ouagadougou (Burkina Faso). . Facteurs associés aux accidents de la route dans la ville de Lubumbashi. .. Facteurs de risque du tétanos néonatal dans l'Ouest du Burkina faso. ..

Conséquences pour la prévention.

Environnement urbain et Leishmaniose cutanée: Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur . Faso . Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso.

6 oct. 2017 . Si la couverture du secteur formel (salarie et fonctionnaire) est ... Ces derniers ont contaminé secondairement l'environnement par leurs excréta. . Trente ans de leishmaniose cutanée dans le foyer de Tadla-Azilal, Maroc. ... et tropicales, CHU Yalgado Ouédraogo, Ouagadougou, Burkina Faso.

7 avr. 2014 . qu'il s'agisse du paludisme, de la dengue, de la leishmaniose ou de la . aussi, car c'est précisément l'effondrement de ces systèmes dans ... été un des secteurs clé dans le cadre de la Coopération belge au .. une recrudescence. .. (à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, Burkina Faso) les.

8 févr. 2017 . riat pour l'environnement". M.Ouali .. que mal- à investir l'Université algérienne par ses bluffs . facteurs ayant entraîné ce désordre partout constaté. .. Leishmaniose cutanée correspond globalement à ... Dossiers du logement au secteur urbain El Amir .. Diabes Noirs (Congo) et RCK (Burkina Faso).

Privilégier la voie sous-cutanée pour les patients hémophiles, souffrant de . en utilisant un antiseptique efficace avec un temps de contact de 15 à 30 secondes. ... Compte tenu de la recrudescence de cas de coqueluche observée chez les .. un aéroport d'un pays à risque 110 BURKINA FASO Paludisme Ouagadougou.

1 nov. 2005 . selles d'individus infectés, ces virus contaminent les eaux de ... (3) Laboratoire de qualité de l'eau et de l'environnement, Université Quisqueya, Port . L'eau provenant du circuit de distribution de la ville con- .. cutanées (leishmaniose cutanée) qui peuvent persister plu- .. urbain et 29 % en milieu rural.

Ces journées feront le point sur toutes les problématiques de la vaccination . Vaccin contre les pneumocoques Bernard Fritzell 16h30-16h45 Analyse de la .. à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et chef de service du laboratoire de biologie .. DES PaTIENTS TroPICaLE La LEISHMaNIoSE CuTaNÉE ChEz La Co-INfECTÉS.

Pr. ALAOUI TAHIRI Kébir*. Pneumo-phtisiologie. 30. Pr. BALAFREJ Amina. Pédiatrie. 31. ... 1)-Répartition géographique des leishmanioses et facteurs favorisants . . -Leishmanioses cutanées et cutanéomuqueuses du Nouveau Monde 7 .. épidémiologiques des cas de leishmanioses sous ses deux formes cliniques.

17 sept. 2010 . Exposition aux facteurs cancérigènes dans le secteur agricole au Maroc .. Mots clés : Leishmaniose cutanée zoonotique ; Modèles additifs .. Dans 30 % des cas, la victime est de la famille (origine, recomposée ou .. depuis 1974 : le cas des vallées de la Bougouriba et du Mouhoun, Burkina Faso.

Couverture de Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Omni badge Environnement urbain et Leishmaniose cutanée. Facteurs à l'origine de la recrudescence de la leishmaniose cutanée et ses conséquences dans le secteur 30 de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. A partir de ces différents constats, j'imagine que les conséquences de la maladie, quelle qu'elle .. ou veineuses, ulcères diabétiques, leishmaniose cutanée ou le pian (OMS, 2013a) . penser que les soins de plaie, souvent invasifs, pourraient être à l'origine d'hémorragies ..

Ouagadougou, au Burkina Faso (Nau, 2008).

1 mai 1999 . Evaluation de la transmission du paludisme dans la ville de Dakar . Exposé introductif : Dengue et milieu urbain en Afrique. .. A propos de 30 observations. .. fant à paludisme, non per os, à Bobo Dioulasso, Burkina Faso, en 2000. .. premier cas de leishmaniose cutanée rapporté en République de.

